


Am. Vogelkers bestrijden met 'Ringen & Rooien'

De Amerikaanse vogelkers (Prunus Serotina) is onder controle te krijgen met het systematisch ringen van zaadragers en het rooien van zaailingen. Deze methode heeft zich in de praktijk bewezen en kan eenvoudig door vrijwilligers worden toegepast. Geen gif, geen grootschalige verstoring, maar wel resultaat.



Ringen +/- op Kniehoogte!

De zaadbank uitputten

De kersen die jaar na jaar in de bodem belanden vormen de 'zaadbank'. Ze blijven 5-7 jaar kiemkrachtig, maar gelukkig komt maar een deel van de kersen uit. De meeste ontkiemende kersen doen dat binnen een jaar of 2-3. Daarna lopen de aantallen sterk terug.

We putten de zaadbank uit door zaailingen stelselmatig uit te trekken of met de spade te rooien. **Het gebruik van de spade spaart je rug en je handen!** Met één of meerdere keren steken op 5-10 cm van de stam steek je de meeste wortels uit en is de plant makkelijk uit te trekken. Combineer Rooien, Ringen en controle op Uitlopers.

Het is niet nodig om het uittrekken jaarlijks te herhalen (alleen zaailingen van +/- 50 cm hoog). Bij een **controle om het jaar** zijn de struiken 1 tot 1½ meter hoog en zijn makkelijk beet te pakken zonder te bukken.

Voor meer informatie zie Natuurwerkers.nl/vogelkers (uitgebreide flyers en ebook).

